

**PHILIPS**

VitalMinds

# Delir – Was ist das?




Delir ist eine akute Störung des **Bewusstseins, der Aufmerksamkeit und der Wahrnehmung**, die häufig bei Patienten auf der Intensivstation auftritt.

Die Entwicklung dieser akuten Störung geht **sehr schnell**. Die Symptome sind im Tagesverlauf unterschiedlich stark ausgeprägt.



Die genauen Ursachen und Vorgänge  
sind noch **ungeklärt**.




# Symptome des Delirs



Verlust des Raum-  
und Zeitgefühls



Wahrnehmungs- und  
Aufmerksamkeits-  
störungen



Halluzinationen



Gedächtnislücken



Motorische  
Störungen



## Risikofaktoren



- ✓ Fortgeschrittenes Alter
- ✓ Bereits bestehende kognitive Beeinträchtigungen
- ✓ Sensorische Beeinträchtigungen

## Risikofaktoren für Patienten auf der Intensivstation




- ✓ Schwere Erkrankungen
- ✓ Medikamenteneinnahme
- ✓ Umweltfaktoren
- ✓ Schlafstörungen
- ✓ Unbeweglichkeit

# Fakten zum **Delir**







Bei bis zu **80%** der Intensivpatienten tritt ein Delir auf

Ein Delir ist sowohl für den betroffenen Patienten  
als auch für die Angehörigen beängstigend



**Ein 37-jähriger  
Patient mit Delir**

*“Da waren überall weiße Ameisen an den Wänden, auf meiner Decke und meinem Glas. Ich schwebte schwerelos durch mein Zimmer und konnte nichts dagegen tun.”*



**Ein 70-jähriger  
Patient mit Delir**

*“Ich lag mit einer anderen Frau in einem Zimmer, sie nahmen uns alle Getränke weg, keiner kümmerte sich um uns. Weder klingeln, noch klopfen oder rufen half. Ich vermutete, im Sterberaum gelandet zu sein.”*

## Delir verursacht Stress und erhöht die Arbeitsbelastung für das Pflegepersonal



**Pflegekraft**

“ Die medizinische Betreuung von Delir-Patienten ist besonders schwierig, wenn man für mehr als einen verantwortlich ist. Da ich nicht die ganze Zeit bei ihnen bleiben kann, muss ich sie häufig im Bett fixieren. ”



**Pflegekraft**

“ Ich sehe die Gefahr den Überblick zu verlieren, weil ich mich zu intensiv um den Delir-Patienten kümmern muss. ”




Die Aufenthaltsdauer verlängert sich

**↑ um 5 bis 10 Tage**

↑ **2x**

erhöhte Sterberate  
auf Intensivstationen



↑ **3x**

erhöhte Sterberate  
innerhalb von 6 Monaten  
(nach dem Krankenhausaufenthalt)





↑ **9x**

höheres Risiko


**von dauerhaft kognitiver Beeinträchtigung**

wie Demenz



Viele der Patienten, bei denen sich ein Delir entwickelt hat, verbringen anschließend den Rest ihres Lebens in einem **Pflegeheim**

# Geschätzte jährliche Kosten für das Gesundheitswesen allein in den USA



# Erfahren Sie **mehr!**

Philips arbeitet an Lösungen für das Delirmanagement auf Intensivstationen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns.

 [thomas.falck@philips.com](mailto:thomas.falck@philips.com) - Forschung

 [gaby.meeke@philips.com](mailto:gaby.meeke@philips.com) - VitalMinds

# Quellen

1. Van Rompaey et al., Intensive Crit Care Nurs (2008) 24:98-107
2. Society of Critical Care Medicine, <http://www.sccm.org/Communications/Pages/CriticalCareStats.aspx>
3. Bittner et al., Annals of Intensive Care (2013) 3:37
4. Ouimet et al., Intensive Care Med (2007) 33:66-73
5. <http://www.icudelirium.org/>
6. Ely et al., JAMA (2004) 291:1753-62
7. Leslie et al., Arch Intern Med. (2008) 168:27-32

